


Behandling af mundsvamp

Svampeinfektion i munden ses ofte hos ældre og syge i forbindelse med:

- dårlig protesehygiejne
- behandling med antibiotika og andre former for medicin
- vitamin- og blodmangel
- stort forbrug af kulhydrater (sukker)

Svampeinfektion kan typisk vise sig på disse måder:

- sår i mundvigene
- revner (specielt i) underlæben
- hvide belægninger på mundslimhinden
- røde, tørre og blanke slimhinder
- sviende og brændende smerter



BEHANDLING

Svampemiddel ordineret (recept): _____

Patient (navn): _____

Der er i dag konstateret svampevækst i mundhulen og behandling med svampemiddel skal foregå således:

- svampemidlet anvendes dagligt: morgen, middag og aften
- svampemidlet anvendes i: _____ 4 uger _____ 6 uger
- munden og protesen gøres grundigt ren
- læg 3 små klatter svampemiddel i overprotesen og sæt den på plads
- læg 3 små klatter svampemiddel i underprotesen og sæt den på plads
- proteserne tages ud om natten og lægges i 0,2% klorhexidinopløsning



Forslag eller kommentarer: Kontakt Hjemmetandlægen: info@hjemmetandlaegen.dk eller tlf.

70 275 285

Copyright© 2010 Hjemmetandlægen I/S

