

Tandkødsproblemer

Der findes forskellige former for tandkødssygdomme:

Gingivitis

er en overfladisk betændelse i tandkødet. Tandkødsranden bliver rødlig, hævet og bløder let ved tandbørstning og brug af tandstikker. Disse forandringer er kroppens reaktion på bakteriebelægninger ("plak"), som har fået lov at samle sig langs tandkødsranden. Gingivitis medfører ingen permanente skader og forsvinder igen, når man fjerner de skadelige bakteriebelægninger.

Parodontose (parodontitis)

er en tandkødsbetændelse, som giver varige skader på de fibre, som holder tanden fast i kæbeknoglen og på selve kæbeknoglen. De første tegn på parodontitis kan være gingivitis, men sygdommen kan også være mere lumsk og først vise sig ved at tandkødslommerne bliver dybere. For at undgå yderligere skade er det vigtigt at fjerne bakterierne. Men knoglen heler ikke op igen.

Fremskreden parodontitis

Parodontitis giver sjældent symptomer, før sygdommen har udviklet sig til dette stadium. Tænderne bliver løse, blødning fra lommerne, enkelte har flyttet sig, og enkelte tænder ændrer position. Ofte er det ikke muligt at redde en angrebne tænder.



Sundt tandkød



Tandkødsbetændelse



Parodontitis



Fremskreden parodontitis

BEHANDLING

Tandlægen eller tandplejeren renser tænderne for at fjerne plak og tandsten over og under tandkødsranden. Det er ofte en tidskrævende og behandling. Målet er at opnå en ren, rodoberflade. Små ujævnheder og furer på tandroden dybt nede i en tandkødslomme gør dette vanskeligt. Med en daglig god mundhygiejne og regelmæssig kontrol kan man i de tidlige stadier behandle med et vellykket resultat. Nedbrydningen kan standses. Hvis tilstanden er mere fremskreden, må man forberede sig på en omfattende behandling og livslang vedligeholdelse. Endelig får man instruktion i at holde tænderne rene, for uden grundig daglig hygiejne, kan parodontose ikke standses.

FOREBYGGELSE

Tandkødssygdomme kan forekomme i alle aldre. Hvis tilstanden opdages på et tidligt stadium, kan den behandles effektivt. Kontakt tandlægen, hvis du mærker en eller flere af følgende symptomer:

- tandkødet er rødt, hævet eller ømt
- tandkødet bløder ofte under tandbørstning eller ved brug af tandstikker
- hyppig og vedvarende dårlig ånde eller dårlig smag i munden

© HjemmeTandlægen; Kilde: Colgate World Of Care

Forslag eller kommentarer: Kontakt HjemmeTandlægen: info@hjemmetandlaegen.dk eller tlf.

70 275 285

Copyright© 2010 HjemmeTandlægen I/S

